




Avertissements agricoles



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX



ABONNEMENT ANNUEL : 105 F Régisseur Recettes D.O.A. CCP DUON 3405-12 K

☎ (80)22.19.38

ÉDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 3 - 14 mars 1985

COLZA

- REPRISE DE LA VEGETATION : EFFECTIVE MAIS LENTE
- CHARANCONS DE LA TIGE : PEU DE CAPTURES DEPUIS LE 5/03
- CYLINDROSPORIOSE : PEU DE PARCELLES A TRAITER DANS L'IMMEDIAT.

Depuis le 5 mars, la végétation a évolué lentement, le décollement du bourgeon terminal est à ce jour peu marqué. La variété **Bienvenu** est cependant plus en avance.

CHARANCONS DE LA TIGE

- SITUATION ACTUELLE : Peu de captures depuis le 5 mars.
- PRECONISATIONS :
 - . Secteurs avec captures pendant la période du 26/02 au 5/03 :
Traitez dès que possible.
 - . Autres situations : Surveillez les pièges surtout si un réchauffement survient.

Si les cuvettes jaunes n'ont été mises en place qu'après le 1/03 des arrivées d'insectes ont pu passer inaperçues.

Tenez compte des piqûres de pontes observées sur la tige ainsi que des piégeages effectués à proximité.

Une piqûre de ponte par pied = seuil de traitement

- SPECIALITES COMMERCIALES :
Utilisez de préférence celles à base de **pyréthrinoïdes**.

CYLINDROSPORIOSE

- STRATEGIE GENERALE DE LUTTE : Voir bulletin n° 2 du 5 mars 1985.
- SITUATION ACTUELLE :

Maladie présente dans tous les départements, à un niveau irrégulier selon les parcelles : le plus souvent faible avec cependant quelques parcelles fortement infestées dans les secteurs de Clamecy et d'Auxerre.

La variété **Jet Neuf** est plus sensible à la cylindrosporiose que les variétés **Bienvenu** et **Darmor**.

- PRECONISATIONS :
Cas général : pas de traitement dans l'immédiat.
Parcelles fortement attaquées (rares) : une intervention est justifiée.

Pf

- SPECIALITES COMMERCIALES :

Employez de préférence **Sportak PF** 1,5 l/ha aux spécialités apportant 500 g/ha de **carbendazime** ou **bénomyl**.

ATTENTION :

L'identification de la Cylindrosporiose est difficile (taches décolorées, liégeuses, rendant l'épiderme cassant).

Il est donc nécessaire d'effectuer un prélèvement de 25 - 30 pieds qui seront laissés dans un sac plastique pendant 1 à 3 jours. L'apparition d'acervules (petits points blancs) sur les feuilles confirmera la présence de Cylindrosporiose et permettra d'estimer son importance.

*

*

*